

Anfotericina B



Marca comercial: Fungizone, Amphocin

La anfotericina B, conocida también como Fungizone o Amphocin, pertenece a la clase de medicamentos llamados antimicóticos. Los hongos son microorganismos causantes de infección en el ser humano. Los antimicóticos eliminan los hongos o les impiden multiplicarse. Las micosis (infecciones causadas por hongos) ocurren en pacientes con inmunodeficiencia, incluso en personas infectadas por el VIH, con más frecuencia que en personas con un sistema inmunitario sano. Las micosis pueden ser también más graves en pacientes con inmunodeficiencia.

Formas de empleo

La anfotericina B está autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el tratamiento de ciertos tipos de micosis graves. También se usa para evitar futuras micosis en pacientes infectados por el VIH que han tenido micosis graves anteriormente.

Presentación/Administración

Se fabrica en líquido para administración intravenosa, por lo general, bajo la supervisión de un médico o una enfermera.

Contraindicaciones

Las personas con enfermedad de los riñones o que reciban quimioterapia o radioterapia deben informárselo al médico antes de tomar este medicamento.

Posibles efectos secundarios

Casi todos los pacientes que toman anfotericina B sufren efectos indeseables. Los dos efectos secundarios más comunes son una mala reacción al administrar el medicamento y problemas renales.

Cuando se administra anfotericina B por vía intravenosa, los pacientes pueden tener fiebre, escalofrío con temblor, baja tensión arterial, inapetencia, náusea, vómito, dolor de cabeza y dificultad respiratoria. Eso suele ocurrir de 1 a 3 horas después de recibir la anfotericina. Muy de vez en cuando, la anfotericina B puede causar una reacción alérgica más grave.

Los problemas renales son un efecto secundario común en pacientes tratados con anfotericina B. Por lo general, la función renal se normaliza después de que los pacientes dejan de tomarla. Sin embargo,

quizá necesiten suspenderla y cambiar a otro medicamento por causa de lesiones renales. Se han fabricado otras formas de anfotericina B que no causan lesiones renales tanto como la tradicional. Esas formas se venden con los nombres de AmBisome, Abelcet y Amphotec. Los pacientes que no pueden tomar anfotericina B tradicional quizá puedan tomar alguna de esas otras formas.

La anfotericina B también puede causar sibilancia o dificultad respiratoria; opresión torácica, erupción cutánea, prurito; irregularidad en los latidos del corazón; calambres o dolores musculares; dolor en el sitio de inyección; dolor de garganta; cansancio o debilidad poco comunes; hemorragia o hematomas poco comunes; adormecimiento, hormigueo, dolor o debilidad de las manos o los pies; pérdida de la audición o silbidos en los oídos; y visión borrosa o doble.

Los pacientes deben informar al médico sobre cualquier síntoma de esos efectos secundarios. Las personas que tomen este medicamento deben preguntar al médico qué medicamentos pueden tomar para reducir esos efectos secundarios.

Interacción con otros medicamentos

Es preciso avisar al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos

Para información sobre ensayos clínicos que tiene que ver con Anfotericina B, visite el sitio Web de ClinicalTrials.gov en: <http://www.clinicaltrials.gov>. En la casilla de búsqueda, escriba: Anfotericina B AND HIV Infections.

Anfotericina B



Fabricantes

Amphotericin B

Bristol - Myers Squibb Co
PO Box 4500
Princeton, NJ 08543-4500
(800) 321-1335

Fungizone

Bristol - Myers Squibb Co
PO Box 4500
Princeton, NJ 08543-4500
(800) 321-1335

Amphocin

Pfizer Inc
235 East 42nd Street
New York, NY 10017-5755
(800) 438-1985

AmBisome

Fujisawa Healthcare Inc
Parkway Center North / 3 Parkway North
Deerfield, IL 60015-2548
(800) 727-7003

Abelect

Enzon, Inc.
20 Kingsbridge Road
Piscataway, NJ 08854-3969
(908) 541-8600

Amphotec

Oryx Pharmaceuticals Inc.
6500 Kitimat Road
Mississauga, Ontario, Canada

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help
De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este